

Instrucciones para el cuidado del paciente Inyecciones intravítreas

Siga estas instrucciones después de las inyecciones oculares:

- No se frote el ojo después del tratamiento.
- Para aliviar el dolor o la irritación de leve a moderado, se puede usar un analgésico de venta libre (p. ej., Tylenol) o una compresa fría o una bolsa de hielo.
- Se puede usar una nueva botella de lágrimas artificiales/gotas lubricantes
- No nadar ni usar lentes de contacto durante 2 días.
- Está bien ducharse y lavarse la cara. Mantenga los ojos cerrados para evitar que entre agua del grifo en los ojos durante 2 días después de la inyección.

Los siguientes síntomas son COMUNES después de inyecciones oculares exitosas durante 1-2 días:

- Visión borrosa
- lagrimeo
- Flotadores leves u círculos oscuros/burbujas en su visión
- Incomodidad o irritación de leve a moderada
- Arenoso, Pestañas en el ojo sensación
- Enrojecimiento (a veces esto puede cubrir toda la parte blanca del ojo y durar algunas semanas, especialmente si está tomando anticoagulantes o aspirina)
- Lágrimas con sangre durante 1-2 días después del tratamiento

Los siguientes síntomas NO SON NORMALES después de las inyecciones en los ojos, y debe llamar a nuestra oficina de inmediato si experimenta:

- Dolor intenso y constante
- Empeoramiento del dolor después del primer día.
- Disminución significativa de la visión.
- Aumento severo de moscas volantes
- Cortina o velo en tu visión

Comuníquese con nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud al (407) 893-8200. La atención de seguimiento es muy importante. Asegúrese de mantener su cita programada.